

	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10
								発展	発展	発展
年齢・性別	64・男	67・男	57・男	59・男	59・女	72・男	73・男	32・男	24・女	68・女
病名	後頭葉脳出血 AVM	脳梗塞	脳梗塞 脳ヘルニア	視床出血 脳室穿破	低血糖	症候性てんかん	小脳出血	脳挫傷 外傷性SAH	解離性障害	くも膜下出血
JCS	0(or1)	3	200	200	10	20	100or0?	2	200?	30
GCS	E4V5M6	E4V2M5	E1V2M4	E1V1M2	E3V4M6	E3V3M5	E1V5M6	E4V4M6	E1V2M4	E2V1M4
ECS	1	2	100W	200E	10	10	1	2	2	20
患者所見		失語 右上下肢麻痺	左上下肢麻痺	刺激で除脳姿勢	無刺激では 質問指示にV2M5	左上下肢不全麻痺	開眼を拒否 頭痛・めまい	始めは閉眼 大声呼びかけ以降開眼	他動的開眼に強く閉眼 drop test顔よける	
ポイント	無刺激で覚醒の観察 見当識	評価手順 麻痺・失語	刺激は徐々に強く 痛み刺激の部位	異常肢位	傾眠患者への質問・指示	GCSの言語反応 (V4とV3)	意識レベルの限界 ECS覚醒3徴候	無刺激覚醒の定義	ECS開眼の定義	ディスカッション
10case	ISLS-3	ISLS-5改	ISLS-7改	PSLS-4改	PSLS-8改		ISLS-1改			PSLS-5改